

NEZAPOMEŇTE DODRŽOVAT

základní očkovací schéma vakcín proti **klíštové encefalitidě** (3 dávky).

Preočkování je pouze jednou dávkou každých 3-5 let.*

poznámky

datum očkování

příští očkování

poznámky

datum očkování

příští očkování

poznámky

datum očkování

příští očkování

poznámky

datum očkování

příští očkování

poznámky


datum očkování

příští očkování




**Od 50 LET HRAZENO
ze zdravotního
pojištění**

Běžné očkovací schéma



Zrychlené očkovací schéma**



Klíšťová encefalitida je onemocnění mozku způsobené virem, který se nejčastěji přenáší prisátím infikovaného klíštěte. Onemocnění může mít **závažný průběh i následky**. Účinná specifická prevence klíšťové encefalitidy je **očkování**, které je možné aplikovat **po celý rok**.

Pro dostatečnou ochranu je důležité celé schéma dokončit.

Po první dávce není ochrana dostatečná. Ochrana nastupuje již 14 dní po aplikaci 2. dávky.

**FSME
immun**

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce a FSME-IMMUN 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci.

Pfizer

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, IČO: 49244809, zapsaná v obchodním rejstříku pod spís. zn. C 20616 u Městského soudu v Praze, tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

*1. dávka přeočkování je podávána po 3 letech od 3. dávky očkování. Poté následuje přeočkování každých 5 let (pro pacienty starší 60 let každé 3 roky).

**Pokud je třeba dosáhnout imunitní odpovědi rychle (například na jaře či v létě), může být druhá dávka podána za dva týdny po první dávce.