

УВАГА: КЛІЩ!

Ви можете заразитися кліщовим енцефалітом будь-де і будь-коли.

Прояви кліщового енцефаліту

Кліщовий енцефаліт – це вірусне захворювання головного мозку.

Захворювання зазвичай має двофазний перебіг; може бути лише одна фаза захворювання або ж воно може протікати безсимптомно.

При потрапленні вірусу в організм людини починається інкубаційний період хвороби, який зазвичай триває 7-14 днів, але іноді може продовжуватися до місяця.

Перша фаза – можливі симптоми та прояви:

- підвищена температура
- втома
- головний біль
- нудота
- біль у м'язах і суглобах

Друга фаза – можливі симптоми та прояви:

- сильні головні болі
- висока температура
- світлобоязнь
- м'язовий тремор
- дезорієнтація
- розлад свідомості
- блювота
- ригідність м'язів шиї
- запаморочення
- розлади сну

Приблизно у 30-60% випадків захворювання може мати довготривалі або навіть незворотні наслідки. Навіть після одужання пацієнт може страждати від головного болю або навіть часткового паралічу. У найважчій формі на різних стадіях захворювання можуть розвиватися паралічі нервів і відмовляти життєво важливі центри, що призводить до летального результату. Перебіг хвороби особливо тяжкий в ослаблених людей та осіб старше 60 років.

Наслідки для здоров'я можуть призвести до тривалої втрати працездатності і, таким чином, погіршити якість вашого життя.

Допоможіть захистити себе і свою сім'ю СВОЄЧАСНО



Ефективною профілактикою кліщового енцефаліту є вакцинація

Лікарі можуть лише полегшити симптоми цього захворювання, але не вилікувати його причину.

Де зробити щеплення

- у свого лікаря-терапевта
- дітям – у сімейного лікаря для дітей та підлітків
- в центрі щеплень (перелік див. на сайті www.pozorkliste.cz)

Виплати компаній медичного страхування

Скористайтеся допомогою своєї компанії медичного страхування

| Код | Компанія мед. страхування | Виплата на вакцинацію в межах профілактичних програм * |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | VZP | діти до 17 років (включно): до 700 чеських крон, дорослі (від 18 років): до 500 чеських крон |
| 201 | VOZP [†] | діти до 17 років (включно): до 1500 чеських крон дорослі (від 18 років): до 700 чеських крон |
| 205 | ČPZP [†] | діти до 17 років (включно): до 1500 чеських крон дорослі (від 18 років): до 1000 чеських крон |
| 207 | OZP [†] | до 1000 чеських крон у вигляді ваучера |
| 209 | ZPŠ | до 2100 крон (700 крон за кожен дозу, включаючи ревакцинацію) |
| 211 | ZPMV [†] | діти й дорослі – до 2000 чеських крон (батько чи мати може зі своєї частини перевести на дитину 500 чеських крон) |
| 213 | RBP-ZP [†] | до 1000 чеських крон (можливість збільшення ліміту грошової виплати на вакцинацію для дітей та молоді до 18 років та застрахованих осіб віком від 60 років шляхом об'єднання ліміту грошової виплати від будь-якої застрахованої особи (+ максимум 9 осіб) |

Наведена вище інформація діє з 1. 2. 2023. Поточний розмір допомоги та порядок її отримання, будь ласка, уточніть у відповідній компанії медичного страхування.

* Виплата для застрахованих осіб, які не мають права на оплату за рахунок коштів медичного страхування.

[†] Сукупна виплата на вакцинацію, для якої не встановлено конкретної допомоги.



ПОКРИТТЯ медичним страхуванням з 50 років


Заражених кліщів знаходять по всій території Чехії

Кількість людей, інфікованих кліщовим енцефалітом у 2013-2022 роках у Чеській Республіці*

*Державний інститут охорони здоров'я


Кліща можна підхопити:

- під час відпочинку на природі
- під час прогулянки в міському парку
- в саду будинку або дачі
- під час занять спортом (їзда на велосипеді, біг, катання на роликівих ковзанах тощо)
- при вигулі собаки або видаленні кліща з її шерсті
- під час збирання грибів



Вакцинація доступна протягом усього року


Звичайний календар щеплення вакциною ФСМЕ-ІМУН



* Якщо імунної відповіді необхідно досягти швидко (наприклад, навесні або влітку), другу дозу можна ввести через два тижні після першої дози.

У випадку обох календарів через 14 днів після другої дози очікується достатній захист на найближчий сезон кліщів

Прискорений календар щеплення вакциною ФСМЕ-ІМУН*



FSME
immun

Вакцини проти кліщового енцефаліту: ФСМЕ-ІМУН по 0,25 мл та 0,5 мл, суспензія для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці. Відпуск лікарських засобів (вакцин) здійснюється за рецептом лікаря. Вакцина ФСМЕ-ІМУН не захищає 100% щеплених осіб. Будь ласка, уважно прочитайте листок-вкладку до препарату.

Pfizer

Pfizer, spol. s r. o.,
Stroupežnického 17,
150 00 Прага 5,
тел.: +420 283 004 111,
www.pfizer.cz

